


MC2-2 Fiche de travail: Érosion

Décris toutes les parties du cours d'eau dessiné. Utilise les termes suivants :

Érosion, Sédimentation, Cours inférieur (potamon), Source, Berge concave, Cours supérieur (crénon), Barre de méandre, Delta, Cours moyen (rhithron), Éboulis




MC2-2 Fiche de travail: Érosion

Solution

Décrivez toutes les parties du cours d'eau dessiné. Utilisez les termes suivants :

Érosion, Sédimentation, Cours inférieur (potamon), Source, Berge concave, Cours supérieur (crénon), Barre de méandre, Delta, Cours moyen (rhithron), Éboulis



MC2-3 Types de roche

Ici, quatre principaux types de roches sont présentées, ainsi qu'une explication de leur formation. En les regardant de près et à l'aide d'outils spécifiques tu pourras les reconnaître et les distinguer les unes des autres.

Grès

Nous connaissons le sable sur les plages au bord de la mer ou sur les rives des rivières. Le sable des grès se trouvait aussi au bord de la mer. Il était recouvert de sable ou de boue fraîche, a été comprimée pendant des millions d'années et s'est transformée en une pierre en se solidifiant.

Tu peux reconnaître un grès en cherchant ces caractéristiques :

- Avec une loupe, on peut observer des grains de sable.
- Certains grains de sable sont si durs qu'ils peuvent rayer l'acier.
- Parfois, dans le grès, on peut même trouver des fossiles de coquillage.



Calcaire

Si tu fais bouillir de l'eau dans une casserole jusqu'à ce qu'elle s'évapore, une poudre blanche restera au fond de la casserole. C'est du carbonate de calcium qui était dissous dans l'eau. Il y a aussi du carbonate de calcium dans l'eau de mer qui, avec les restes de coquillages et d'autres organismes marins morts, coule au fond de la mer où il forme de la boue. Ces boues sont ensuite recouvertes de nouvelles couches de boues jusqu'à ce que leur poids soit si important qu'elles se transforment en une roche calcaire.

Tu peux reconnaître un calcaire en cherchant ces caractéristiques :

- Une roche calcaire peut avoir différentes couleurs : blanc, jaune, verdâtre à noir, mais surtout gris.
- Parfois dans le calcaire on peut trouver des fossiles comme des coquillages.
- Si tu mets une goutte d'acide chlorhydrique sur du calcaire il se produit une réaction d'effervescence.
- Le calcaire est une roche relativement tendre et normalement ne rayer pas l'acier. Il existe cependant une exception, le calcaire siliceux, qui est dur et rayer l'acier.



MC2-3 Types de roche

Ici, quatre principaux types de roches sont présentées, ainsi qu'une explication de leur formation. En les regardant de près et à l'aide d'outils spécifiques tu pourras les reconnaître et les distinguer les unes des autres.

Granite

À l'intérieur de la terre, les températures sont tellement élevées que les roches peuvent entrer en fusion. La masse rocheuse fondue est appelée magma. Le magma peut se refroidir lentement dans la croûte terrestre et redevenir une roche. C'est ainsi que se forme le granite.

Tu peux reconnaître un granite en cherchant ces caractéristiques :

- Le granit est composé de différents minéraux sous forme de cristaux : Feldspath, quartz et mica.
- Les feldspaths sont souvent angulaires, blancs, vert clair ou roses.
- Le quartz est transparent et assez dur pour rayer l'acier.
- Les micas sont des plaques hexagonales fines, pour la plupart brun foncé et brillantes.



Gneiss

Pendant le plissement des Alpes, les roches existantes ont été en partie enfouies en profondeur dans la croûte terrestre. Ils ont été exposés à des fortes pressions et à des températures élevées. Les roches ont été pressées et leur structure a changé en raison d'une fonte partielle. Ce processus a amené à la formation de nouvelles roches.

Tu peux reconnaître un gneiss en cherchant ces caractéristiques :

- Le gneiss est souvent strié, avec des bandes ou des couches claires et foncées. Parfois, elles sont pliées.
- Les gneiss peuvent avoir différentes couleurs et compositions minérales.
- Comme le granit, le gneiss se compose souvent de feldspath, quartz et mica. Les différents minéraux ne sont pas uniformément répartis mais plutôt disposés en bandes ou en couches.



MC2-3 Clé de détermination des roches pour débutant

Bon à savoir : la couleur est rarement un critère de détermination fiable.

A Roche composée de différents types de minéraux

A1 Effervescence avec de l'acide (mousse)

non rayable (donne une ligne argentée)

Brèche du Niesen


composants angulaires, pièces de dolomite brun-orange

Conglomérat, molasse helvétique

Composants arrondis, cristallins ou sédimentaires

Tillites

similaire au Béton



rayable (montre une entaille)

(pas d'exemples)

A2 pas d'effervescence à l'acide (ne mousse pas)

non rayable (donne une ligne argentée)

Granite

Structure grenue, fine ou grossière, parfois porphyrique

Gneiss


Structure en couches (œillé ou folié)

Brèche quartzitique

coloration très variable

Porphyre

Phénocristaux clairs bien visibles, rougeâtre



rayable (montre une entaille)

Poudingue

composants angulaires, souvent de couleur violette



Légende :

Caractéristiques principales (identifiables à l'œil nu)

Teneur en calcaire, réaction à l'acide chlorhydrique

Dureté mesurée en se basant sur l'acier

Nom de la roche

Caractéristiques typiques

B Roche composée d'une masse +/- uniforme, pouvant être traversée par des bandes claires.

B1 Effervescence avec de l'acide (mousse)

non rayable (donne une ligne argentée)

Calcaire siliceux

principalement foncé, ballaste de voie, liant calcaire



rayable (donne une entaille)

Ardoise

stratifié, surfaces brillantes



Cargneule

structure friable en cellules



Grès

couleur et granulométrie très variable



Grès de Taveyannaz

moucheté



Calcaire

coloration variable, ev. bandes/fossiles



B2 pas d'effervescence à l'acide (ne mousse pas)

non rayable (donne une ligne argentée)

Quartzite

cassure conchoïdale, couleur claire



Amphibolite

texture grenue, très solide



Radiolarite

très dur, rouge



Chert

Silex, coloration variable



rayable (donne une entaille)

Serpentinite

lourd, tonalités vertes variables



Légende :

Caractéristiques principales (identifiables à l'œil nu)

Teneur en calcaire, réaction à l'acide chlorhydrique

Dureté mesurée en se basant sur l'acier

Nom de la roche

Caractéristiques typiques

MC2-4 Sol typiques du Seeland

Les pédologues distinguent d'innombrables types de sol différents. Ces images montrent les trois types les plus fréquents dans le Seeland. À l'aide de ces images, différentes fonctions du sol peuvent être discutée (cf. DR Sol).



Sol brun

La plupart du temps, quand nous pensons au « sol », nous l'imaginons brun et aéré, traversé par des racines et des tunnels de verre de terre. La photo montre un champ dans la vallée de l'Aar, développé sur des matériaux morainiques de la dernière glaciation. Au cours des dix mille dernières années, un sol profond et fertile s'est développé ici. Ce champ n'a plus été labouré depuis 1993, sa structure et les êtres vivants qui l'habitent ont pu évoluer sans perturbations. Sur un mètre carré de ce sol, on peut produire environ 1,5 dl d'huile de colza par an. Sous la moraine, on peut voir les dépôts de gravier et de sable posés par les rivières issues de la fonte des glaciers qui coulaient ici pendant les périodes plus chaudes. Cette couche est exploitée et utilisée dans la gravière.

MC2-4 Sol typiques du Seeland



Fluvisol

Ce type de sol jeune se trouve dans l'ancienne plaine alluviale de l'Aar. L'Aar, avant la correction des eaux du Jura, coulait libre à travers le Seeland en formant plusieurs larges bras. Lors de chaque crue, ou lors d'un changement de son cours, il laissait un dépôt de sable et de gravier. Les variations de la vitesse d'écoulement ont formé plusieurs couches. Quand l'Aar coulait lentement, c'était du matériel fin qui était déposé. Par contre, lorsque sa vitesse d'écoulement était rapide, il pouvait aussi transporter du matériel plus grossier. Seule la couche supérieure est devenue riche en humus (brune) lors de la formation du sol. Sur un mètre carré de ce Fluvisol on produit environ 1.1 dl d'huile de tournesol.


MC2-4 Sol typiques du Seeland



Tourbe

Autrefois, le Seeland était un immense marais. Diverses zones étaient constamment humides et régulièrement inondée. À cause de cette humidité, la matière organique se décompose beaucoup plus lentement que dans d'autres sols. La décomposition forme une couche tourbeuse brun foncé-noir, riche en nutriments, idéale pour la culture maraîchère. La tourbe est située sur une couche d'argile imperméable. Sur un mètre carré du champ illustré ici, on peut produire environ 5 kg de carottes par an. Cependant, si un sol tourbeux est drainé et régulièrement retourné, la tourbe se décompose rapidement et perd jusqu'à 2 cm par an, ce qui libère beaucoup de CO₂. En conséquence, la qualité des sols dans le Seeland est en baisse constante.

MC2-5 Mandalas à compléter et colorier : Sonneur à ventre jaune



MC2-5 Mandalas à compléter et colorier : Crapaud calamite



MC2-5 Mandalas à compléter et colorier : Petit gravelot



MC2-5 Mandalas à compléter et colorier : Couleuvre à collier



MC2-6 Photos aériennes de la gravière à Lyss

Compare les 4 photos aériennes. Qu'est-ce qui a changé ? Marque les différences avec des numéros et crée une liste dans laquelle tu décris tous les changements le plus précisément possible.



1992



2000



2004



2008




2011



2024

Source Photos aériennes : SwissTopo

MC2-6 Schéma du fonctionnement d'une gravière





MC2-7 Théâtre de la gravière

La classe est divisée en groupes. Chaque groupe reçoit une carte avec une scène.







Les élèves réfléchissent ensemble sur la meilleure façon de représenter leur scène. Quels types de machines sont impliqués, quels types de bruits font-elles, quelles activités ou quels mouvements sont effectués ? Qui assume quel rôle : trax, cailloux, rocher, station de lavage, broyeur, maison ?

Après 30 minutes, chaque groupe présente sa scène. Le reste de la classe devinera quelle partie du cycle des matériaux est présentée.

Scènes :

- Dégagement du gravier
- Lavage et triage
- Cassage
- Construction
- Démolition et recyclage
- Décharge

MC2-7 Théâtre de la gravière - scènes

<p>Dégagement du gravier</p>  <p>Éléments:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gravière • Chargeur à pneu • Machiniste • Gravier • Bloc erratique • Bande transporteuse 	<p>Lavage et triage</p>  <p>Éléments:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bande transporteuse • Gravier • Station de lavage • Centrale de tri (tamis) • Épuration des eaux • Boue de lavage 	<p>Broyage</p>  <p>Éléments:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trax • Camions • Boulets • Broyeur • Centrale de tri (tamis) • Gravillon (pierres cassées)
<p>Construction</p>  <p>Éléments:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bétonnière • Excavateur • Travailleurs/travailleuses • Camions • Matériaux excavés • Grue 	<p>Démolition et recyclage</p>  <p>Éléments:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ancien bâtiment • Pelle mécanique avec pince • Benne • Broyeur mobile • Canon à eau • Aimant 	<p>Décharge</p>  <p>Éléments:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gravière vide • Camions • Matériau d'excavation ou matériaux inertes • Bulldozers • Préposé/e au contrôle d'entrée

MC2-11-17 Table de détermination des plantes : milieux humides

Roseau commun (*Phragmites australis*)

- Floraison : juillet - septembre
 Famille : Poacées
 Description : 100 - 300 cm; tige ronde; feuilles allongées jusqu'à 50 cm
 Fleur : panicule rougeâtre, inclinée au sommet
 Particularité : Aime les sols marécageux et les alentours des plans d'eau. Les tiges sont utilisées comme couverture pour les toits (chaume)



Massette à larges feuilles (*Typha latifolia*)

- Floraison : juin - juillet
 Famille : Typhacées
 Description : 100 - 300 cm; feuilles longues et étroites couvrant la tige ronde
 Fleur : inflorescence femelle en épi brun, sur lequel pousse l'inflorescence mâle (petite et jaunâtre)
 Particularité : les oiseaux se servent des fleurs duveteuses pour garnir leur nid



Carex ou Laïches (*Carex sp.*)

- Floraison : avril - août
 Famille : Cyperacées
 Description : 20 - 100 cm; tige triangulaire; feuilles à profil en forme de « W » et souvent légèrement coupantes
 Fleur : épis ou globules discrets, de couleur brune, noire ou verte
 Particularité : forment des pelouses dans les zones temporairement inondées



Jonc des tonneliers (*Schoenoplectus lacustris*)

- Floraison : juin - août
 Famille : Cyperacées
 Description : 80 - 200 cm; tige ronde sans feuilles, partie intérieure spongieuse
 Fleur : nombreux épis bruns et discrets à la terminaison de la tige
 Particularité : les joncs étaient déjà utilisés à l'âge de la pierre pour la fabrication de paniers et de nattes



Petite centaurée élégante (*Centaureum pulchellum*)

- Floraison : juillet - septembre
 Famille : Gentianacées
 Description : 2 - 15 cm; tige ramifiée; feuilles oblongues-lancéolées, opposées
 Fleur : petite (<1 cm), rose, à cinq pétales et jaune en son centre
 Particularité : aime les sols pauvres, humides et caillouteux ou sableux, pour cette raison elle est souvent une espèce cible dans les gravières



MC2-11-17 Table de détermination des plantes : milieux humides

Eupatoire chanvrine (*Eupatorium cannabinum*)

- Floraison : juillet - septembre
 Famille : Astéracées
 Description : 50 - 175 cm; tige anguleuse et velue; feuilles lancéolées jusqu'à 10 cm de longueur
 Fleur : rose, plusieurs inflorescences en ombelle
 Particularité : elle est aussi appelée origan des marais



Salicaire commune (*Lythrum salicaria*)

- Floraison : juillet - août
 Famille : Lythracées
 Description : 30 - 120 cm; tige velue au moins sur deux côtés; feuilles ovales plus ou moins velues ou complètement glabres
 Fleur : rose, groupées en épi
 Particularité : plante comestible et médicinale, aussi utilisée pour tanner le cuir




Epilobe velu (*Epilobium hirsutum*)

- Floraison : juillet - septembre
 Famille : Onagracées
 Description : 50 - 180 cm; tige rameuse et velue; feuilles sessiles et bordées de petites dents dirigées en avant, peuvent être plus ou moins velues
 Fleur : pourpre, jusqu'à 4 cm, suivi par un fruit allongé divisé en 4 parties
 Particularité : graines plumeuses, transportées par le vent et l'eau



Herbe aux écus, Lysimaque nummulaire (*Lysimachia nummularia*)

- Floraison : mai - août
 Famille : Primulacées
 Description : env. 5 cm de haut mais avec une tige couchée atteignant 50 cm, pousse souvent dans l'eau; feuilles arrondies, opposées
 Fleur : jaune, ronde, avec 5 pétales en forme de cœur
 Particularité : était utilisée par le passé comme remède pour soigner les plaies



Plantain d'eau (*Alisma plantago-aquatica*)

- Floraison : juin - août
 Famille : Alismatacées
 Description : 30 - 100 cm; feuilles aériennes en forme de fer de lance, feuilles immergées en forme de ruban
 Fleur : tige ramifiée avec nombreuses petites fleurs blanches ou roses
 Particularité : souvent pollinisé par des Syrphides dont les larves sont aquatiques



MC2-11-17 Table de détermination des plantes : prairies maigres / sèches

Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum*)

- Floraison : juin - septembre
 Famille : Hypéricacées
 Description : 30 - 60 cm; tige glabre avec 2 bords longitudinaux; feuilles avec points transparents
 Fleur : jaune, en touffes, avec des points foncés sur les pétales
 Particularité : l'huile rouge qui en est extraite est un remède reconnu



Centaurée scabieuse (*Centaurea scabiosa*)

- Floraison : juin - août
 Famille : Astéracées
 Description : Max. 120 cm; tige rugueuse; feuilles pennées et étroites
 Fleur : couleur variable rouge-violet, capitule d'environ 4 cm, posé sur un «bouton» sphérique à l'extrémité de la tige
 Particularité : les graines sont disséminées par les fourmis et autres animaux



Thym pouliot (*Thymus pulegioides*)

- Floraison : juin - octobre
 Famille : Lamiacées
 Description : 5 - 40 cm; partie inférieure lignifiée, aromatique, tige dressée ou rampante; feuilles petites et arrondies, à pétiole court ou sessiles
 Fleur : à la terminaison des ramilles, sphérique, rose à violette
 Particularité : plante médicinale à feuilles persistantes



Scabieuse colombarie (*Scabiosa columbaria*)

- Floraison : fin juin - octobre
 Famille : Caprifoliacées
 Description : 20 - 80 cm; tige rameuse; feuilles inférieures indivises, feuilles supérieures pennées et poilues sur les nervures et aux bords
 Fleur : lilas à bleu violacé, globules de 1.5 - 3.5 cm
 Particularité : particulièrement appréciée par les demi-deuils et autres papillons



Œillet des Chartreux (*Dianthus carthusianorum*)

- Floraison : juin - septembre
 Famille : Caryophyllacée
 Description : 15 - 45 cm; tige et feuilles glabres; feuilles longues et étroites
 Fleur : pourpres, env. 2 cm, plusieurs fleurs à la terminaison de la tige
 Particularité : par le passé, on les trouvait fréquemment dans les jardins des monastères, d'où son nom de Chartreux



MC2-11-17 Table de détermination des plantes : prairies maigres / sèches

Origan (*Origanum vulgare*)

Floraison : juillet - septembre

Famille : Lamiacées

Description : 20 - 60 cm; tige uniformément velue ou plus densément sur 2 faces opposées; feuilles ovales velues ou glabres

Fleur : subsessiles (tige courte), bractées pourpres, corolle rose clair

Particularité : aussi appelé marjolaine sauvage, plante aromatique et médicinale



Anthyllide vulnéraire (*Anthyllis vulneraria*)

Floraison : juin - septembre

Famille : Fabacées ou Légumineuses

Description : 5 - 40 cm; plusieurs tiges dressées; feuilles basales souvent non divisées, feuilles de la tige divisées avec feuille terminale plus grande

Fleur : jaune-or, blanche à la base, glomérules dressés de 2 - 4 cm

Particularité : était utilisé jadis pour le traitement des blessures



Petite pimprenelle (*Sanguisorba minor*)

Floraison : mai - août

Famille : Rosacées

Description : 20 - 50 cm; tige dressée; feuilles divisées en plusieurs folioles fortement dentées (=imparipennées)

Fleur : plusieurs petites têtes globuleuses, fleurs femelles roses

Particularité : les feuilles sont comestibles et ont un goût de concombre



Achillée millefeuille (*Achillea millefolium*)

Floraison : juillet - septembre

Famille : Asteracées

Description : 15 - 50 cm; tige anguleuse; feuilles étroitement pennées, aromatiques

Fleur : inflorescence blanche, ombellée, avec des capitules jaunes

Particularité : plante médicinale, utilisée jadis pour jaunir la laine



Esparcette commune (*Onobrychis viciifolia*)

Floraison : juillet - septembre

Famille : Fabacées ou Légumineuses

Description : 30 - 90 cm; tige dressée; feuilles alternes imparipennées avec 6 à 12 paires de folioles elliptiques

Fleur : rose, disposées en panicules, le plus souvent veinées de rouge

Particularité : graines épineuses, se propagent en s'accrochant aux animaux



MC2-11-17 Table de détermination des plantes : zones rudérales

Carotte sauvage (*Daucus carota*)

Floraison : juillet - octobre

Famille : Apiacées ou Umbellifères

Description : 30 - 60 cm; tige velue, creuse; feuilles divisées en deux ou trois parties

Fleur : blanche, fleur centrale pourpre/noirâtre

Particularité : forme sauvage de la carotte, facilement reconnaissable à l'odeur



Cardère sauvage (*Dipsacus fullonum*)

Floraison : juillet - août

Famille : Caprifoliacées

Description : 90 - 200 cm; tige épineuse; feuilles soudées 2 à 2 en godet traversé par la tige, épineuses dessous, limite de la feuille glabre

Fleur : pourpre, inflorescence épineuse ovoïde (en forme d'œuf)

Particularité : aime les sols pierreux, calcaires et azotés



Tussilage ou Pas d'âne (*Tussilago farfara*)

Floraison : février - mai

Famille : Astéracées

Description : 15 - 20 cm; tige à écailles brunâtres; feuilles en forme de cœur à pétiole long, velues feutrées, absentes au moment de la floraison

Fleur : jaune, 0.7 - 1 cm, unique au sommet de la tige

Particularité : plante pionnière, stabilise les sols sablonneux et gravillonneux



Laitue serriole (*Lactuca serriola*)

Floraison : juillet - septembre

Famille : Astéracées

Description : 30 - 120 cm; tige ronde et glabre; feuilles lobées avec bord denté, épineuses sur les bords et sur la nervure dorsale

Fleur : jaune clair, environ 1 cm, similaire à la fleur du pissenlit

Particularité : les feuilles s'alignent en direction des points cardinaux



Chicorée sauvage (*Cichorium intybus*)

Floraison : juin - octobre

Famille : Astéracées

Description : 30 - 140 cm; tige rougeâtre à rameaux raides; feuilles lancéolées, dentées et poilues sur la partie ventrale

Fleur : bleu clair, capitules de 3 - 5 cm

Particularité : forme sauvage de la chicorée, la racine sert de substitut de café



MC2-11-17 Table de détermination des plantes : zones rudérales

Mélilot blanc (*Melilotus albus*)

- Floraison : juillet - septembre
 Famille : Fabacées ou Légumineuses
 Description : 30 - 130 cm; tige très ramifiée; feuilles à 3 folioles pétiolulées, denticulées
 Fleur : blanches, 3 - 5 mm en grappes allongées et étroites
 Particularité : aime les sols caillouteux, a une odeur douce



Lotier corniculé (*Lotus corniculatus*)

- Floraison : mai - septembre
 Famille : Fabacées ou Légumineuses
 Description : 5 - 30 cm; tige ascendante ou dressée; feuilles fines en 5 parties
 Fleur : jaune, regroupées en petites têtes
 Particularité : aime les sols limoneux meubles et riches en calcaire ; très apprécié par les abeilles sauvages



Vipérine commune (*Echium vulgare*)

- Floraison : juin - septembre
 Famille : Boraginacées
 Description : 30 - 120 cm; tige non ramifiée avec poils perçants; feuilles hérissées et étroites
 Fleur : d'abord rougeâtre, puis bleue, disposées en panicules
 Particularité : plante médicinale, les poils la protègent contre les ravageurs



Petite mauve (*Malva neglecta*)

- Floraison : juin - septembre
 Famille : Malvacées
 Description : 10 - 40 cm; tige souvent couchée; feuilles dentées et lobées
 Fleur : rose clair à 5 pétales
 Particularité : les fruits, qui ont un goût similaire au fromage, étaient transformés en farine lors des périodes de disette



Molène (*Verbascum thapsus*)

- Floraison : juillet - septembre
 Famille : Scrophulariacées
 Description : 30 - 150 cm; tige dressée; feuilles rétrécissant vers le haut, feutrées, velues
 Fleur : jaune, parfumée, en longues panicules
 Particularité : plante médicinale



MC2-11 Protocole de recherche : Plantes

Ce protocole de recherche appartient à :

Nom de la plante :

Famille :

Taille de la plante :

Nombre de fleurs si présents :

Couleur :

Comment sont arrangées les fleurs :

Nombre de feuilles si présentes :

Pourquoi ai-je choisi cette plante :

Croquis ou photo de la plante :

MC2-11 Protocole de recherche : Plantes

Habitat de la plante - Coche la bonne case :

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> sec | <input type="checkbox"/> humide | <input type="checkbox"/> mouillé |
| <input type="checkbox"/> chaud | <input type="checkbox"/> temperé | <input type="checkbox"/> frais |
| <input type="checkbox"/> ensoleillé | <input type="checkbox"/> mi-ombragé | <input type="checkbox"/> ombragé |
| <input type="checkbox"/> sol sableux | <input type="checkbox"/> sol terreux | <input type="checkbox"/> sol pierreux |

Comment la plante est-elle adaptée à cet habitat ?

Peux-tu observer des insectes ou d'autres animaux sur cette plante ?

Si oui, lesquels :

Qu'elle est leur relation avec la plante ?

- Ils la mangent
- Ils la pollinisent
- Ils l'utilisent comme cachette
- Ils l'utilisent pour la reproduction

Est-elle adaptée à la visite de ces animaux ? Comment ?

Que remarques-tu d'autre d'intéressant ?

MC2-12 Images « Qui suis-je ? »



Dytique



Foulque macroule



Hermine



Crapaud commun



Lièvre brun



Escargot de Bourgogne



Renard roux



Hérisson



Lézard des souches



Couleuvre à collier



Criquet



Machaon



Grenouille verte



Anax empereur



Argiope frelon



Lézard des murailles



Souris



Rouge-gorge



Abeille sauvage



Sonneur à ventre jaune



Orvet



Gendarme



Cicindèle



Petite tortue



Geris



araignée-loup



Triton alpestre




Hirondelle de rivage


MC2-13-14-15 Règles pour la capture des petites bêtes



Les animaux ressentent de la douleur et peuvent être blessés, tout comme toi. Traite-les avec respect !




Ne cours pas dans les lieux de capture. Tu risques de renverser ou de marcher sur un récipient contenant des petits animaux.



Place toujours les animaux capturés à l'ombre (sous un arbre, un parasol), sinon ils risquent de surchauffer. Si ce n'est pas possible, libère-les rapidement.




Ne prends pas les animaux dans ta main, mais observe-les dans un récipient. Surtout les amphibiens : ils ont une peau très sensible !



Ne place pas des animaux qui peuvent se manger les uns les autres dans de petits récipients tels que des loupes ou des tubes.



Les animaux aquatiques ont besoin d'eau, sinon ils étouffent ! Mets-les toujours dans un récipient rempli d'eau.



Ne capture que 2 à 3 animaux par espèce et observe-les de près. C'est un gros stress de se faire attraper plusieurs fois, surtout pour les amphibiens !



Relâche toujours délicatement les animaux là où tu les as capturés. Rince bien les récipients et le matériel de capture.

Conseil pour la capture :

Animaux aquatiques : Au lieu de chercher des animaux en regardant dans l'eau, prends un filet et tire-le lentement à travers les plantes submergées. Ainsi, tu attrapes automatiquement les petites bêtes qui se cachent dans le feuillage. Ensuite relâche-les rapidement dans une baignoire (pose le filet à l'envers dans l'eau).

Animaux terrestres : Fait passer rapidement le filet à travers l'herbe/les fleurs, ensuite tourne-le pour refermer l'ouverture. Après, mets le tube dans le filet depuis le bas et ferme le tube avec le bouchon en mousse (ne pousse pas le bouchon trop loin !)

MC2-13 Protocol d'observation des animaux terrestres

Nom/s: Date:


Lieu:

Cherche un animal et observe-le de près. Peux-tu répondre aux questions suivantes ?

Décris ton animal (couleur, taille, forme):

Photo/dessin

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Comment se déplace-t-il ? A-t-il des pattes, des ailes ? Combien ?

.....

Peux-tu observer son régime alimentaire ? Ou peux-tu le supposer ?

.....

Dans quel habitat se trouve-t-il ?

.....

De quel animal s'agit-il ? Comment pourrais-tu le déterminer ?

.....

MC2-14 Protocol d'observation: Grenouille

Nom/s: Date:

Lieu :

Cherche une grenouille et observe-la de près. Peux-tu répondre aux questions suivantes ?

À quoi ressemble ta grenouille ?

Couleur :

Taille :

Sais-tu à quelle espèce elle appartient ?

.....



Photo/dessin

Comment se comporte-t-elle ?

.....
.....
.....

S'agit-il d'un mâle ou d'une femelle ? Comment le reconnais-tu ?

.....

Où se trouve cette grenouille ? Quel est son habitat ? Comment y est-t-elle adaptée ?

.....
.....
.....
.....
.....

MC2-14 Protocol d'observation : Libellule

Nom/s : Date :


Lieu :

Cherche une libellule/demoiselle et observe-la attentivement. Peux-tu répondre aux questions suivantes ?

S'agit-il d'une libellule ou d'une demoiselle ?



Libellule



Demoiselle



Photo/dessin

Descrirs son apparence et son comportement

.....
.....
.....

Où se trouve cette libellule ? Quel est son habitat ? Pourquoi, à ton avis ?

.....


Comme se comporte-t-elle quand rencontre-t-elle d'autres libellules ?

.....

Comme se comporte-t-elle quand elle rencontre d'autres espèces d'animaux ?

.....

MC2-15 Fiche de détermination : Animaux du sol




MC2-15 Instructions pour la fabrication d'un appareil de Berlese

La plupart des petits animaux du sol ne sont pas facilement observables, car ils se cachent dans le sol et fuient la lumière. Quelques-uns d'entre eux sont tellement petits qu'ils ne peuvent être observés seulement avec une loupe binoculaire. Il y a un moyen pour observer ces petites bêtes : l'appareil de Berlese.

Avec une lampe puissante, on illumine un échantillon de sol. Afin de fuir la lumière, les animaux s'enfoncent et tombent dans un récipient.

Matériel :

1 lampe de bureau avec ampoule de 60 W, 1 entonnoir (plus large que la boîte), 1 rouleau de papier ménager, 1 tamis à mailles grossières, 1 boîte en aluminium vide (ou similaire, doit être sombre à l'intérieur), divers échantillons de sol, loupe binoculaire/microscope.



Instructions : Mets du papier ménager humide dans la boîte. Place ensuite l'entonnoir et le tamis sur la boîte comme indiqué sur l'image et pose l'échantillon de sol dans le tamis. Place la lampe au-dessus de l'échantillon de sol et allume-la. Ensuite, éteins la lumière dans la pièce et attend quelques heures ou encore mieux toute la nuit.

Les animaux n'aimant pas la lumière sont maintenant sûrement tombés dans le récipient. Examine-les sur le papier ménager à l'aide d'une loupe binoculaire ou d'un microscope : Combien de pattes ont-ils ? Quelle forme a leur corps ? Peux-tu les identifier à l'aide de livres ou de tables d'identification ?

MC2-16 Travail de recherche sur les abeilles sauvages

1. Décris, dessine, prends en photo ou filme une abeille sauvage aussi précisément que possible. Peux-tu déterminer à quelle espèce ou groupe d'espèces elle appartient ?

2. Combien d'individus de la même espèce peux-tu observer ?

3. Observe-tu d'autres espèces d'abeilles sauvages ? Combien ?

4. Les abeilles sauvages ont plusieurs ennemis naturels. En plus des araignées et des lézards, elles ont aussi plusieurs parasites de couvée comme l'abeille coucou, la guêpe d'or, l'Ichneumon, et le grand bombyle. Peux-tu observer quelques-unes de ces espèces antagonistes dans les nichoirs ? Lesquels ? Comment se comportent-ils ?

5. Essaie de suivre une seule abeille sauvage et observe ce qu'elle fait. Quels types de comportements peux-tu observer ?

- Récolter du nectar ou du pollen
- Construire le nid

- 5a. Pendant combien de temps l'abeille quitte-t-elle le nichoir ? Mesure le temps jusqu'à ce qu'elle revienne !

- Prendre un bain de soleil
- Dormir
- Se reproduire
- Défendre son territoire
- Autres comportements :
